

DESCRIPCIÓN RETROSPECTIVA DE USO Y CAMBIO DE BIOLÓGICOS EN NUESTRA UNIDAD DE ASMA GRAVE (2021-2024)

Martínez Alcaina V, Muñoz Ramírez M, Lemes Mendoza C, Navarro Guerrero M, López-Sáez MP, Sánchez-Guerrero Villajos IM, Carrillo Fernández-Paredes P, López Sánchez JD, Meseguer Arce J.

INTRODUCCIÓN

No hay estudios que demuestren una clara superioridad de un biológico sobre otro en asma grave. Debido al bajo nivel de evidencia, las guías sobre elección de biológicos se basan en recomendaciones y no hay criterios universalmente estandarizados de respuesta a biológicos. Por otra parte, hay pocos estudios sobre resultados de cambio de biológicos.

Solo un 30-50% de pacientes tiene una respuesta total o parcial tras el primer biológico. Por tanto, hasta 2 o más cambios entre biológicos pueden ser frecuentes y aumentar, de forma significativa, el porcentaje final de pacientes respondedores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se recopilaron datos referentes al tratamiento de los 122 pacientes registrados en nuestra Unidad de Asma Grave (UGA) entre 2021 y 2024.

RESULTADOS

56 pacientes (45,9%) recibieron tratamiento con algún fármaco biológico. En este grupo, se registraron 11 cambios de biológico (19,6%). De éstos, 8 pacientes cambiaron de omalizumab, 6 a mepolizumab y 2 a benralizumab; otros 2 pacientes cambiaron de mepolizumab a tezepelumab (1) y a dupilumab (1), y 1 desde benralizumab a dupilumab. Solo uno de los cambios fue debido a efectos adversos.

Se adjuntan unas tablas con datos pormenorizados de los resultados.

CONCLUSIONES

- 1.- El porcentaje de pacientes que cambian de biológico en nuestra UAG es relativamente bajo.
- 2.- En todos ellos, solo se ha cambiado 1 vez de biológico.

3.- Es necesario seguir estudiando de forma longitudinal la eficacia de los biológicos en la población de asma grave.

TABLA 1

	Nº pz	%	Cambios	%
OMALIZUMAB	27	48,21%	8	29,62%
MEPOLIZUMAB	11	19,64%	2	18,18%
DUPILUMAB	9	16,07%	0	0,00%
BENRALIZUMAB	8	14,29%	1	12,5%
TEZEPELUMAB	1	1,79%	0	0,00%
Total	56	45,90%	11	19,64%